



ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CANARIAS. INFORMACION SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL PARA PADRES SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS (CAV), PERTENECIENTE A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP).

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP) en su última publicación (Enero 2019) sobre el calendario vacunal recomendado para la población pediátrica Española, incluye con diferentes grados de recomendación (sistemática, recomendable y grupos de riesgo), algunas vacunas NO FINANCIADAS por el Servicio Canario de Salud en el momento actual.

Estas vacunas son las siguientes:

1. Vacunas antirotavirus El rotavirus es el principal productor de diarrea en los primeros años de la vida y afecta, al menos una vez, a todos los niños menores de 5 años. Las vacunas disponibles han demostrado su seguridad y eficacia en niños a término y prematuros.

No hay datos de seguridad, inmunogenicidad o eficacia si se intercambian las 2 vacunas, por lo que se recomienda completar la pauta de administración con la misma vacuna.

Rotateq[®] Se administran vía oral 3 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo 4 semanas. La primera dosis debe administrarse antes de la 12 semana de vida y la última antes de la 32 semana.

Rotarix[®]: Se administran vía oral 2 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo de 4 semanas. La primera dosis debe administrarse antes de la 12 semana de vida y la última dosis debe administrarse antes de la 24 semana.

2 Bexsero[®] Esta vacuna inmuniza frente a las infecciones producidas por meningococo B. Este germen produce meningitis y sepsis, que aunque es poco frecuente es muy grave y produce secuelas importantes y una mortalidad que ronda el 10 % (fallece uno de cada 10 afectados). Aunque nadie esta libre de resultar infectado por el germen, la enfermedad principalmente afecta a niños pequeños y adolescentes, por lo demás sanos. La pauta de vacunación varía según a la edad en que esta se inicie. Consulte con su pediatra. **En Septiembre 2019 el Servicio Canario de Salud incluye la vacuna Bexsero en el Calendario sistemático de la Comunidad para todos los niños nacidos a partir del 1 de Julio de 2019.**

3. Vacuna frente al Meningococo ACWY (Nimenrix® y Menveo®). En septiembre de 2017 se pone a disposición del público general la vacuna tetravalente frente a los serotipos A, C, W135 e Y del meningococo. Como consecuencia de los cambios epidemiológicos observados en la enfermedad meningocócica invasora durante los últimos años en España, donde se constata un incremento significativo de los serogrupos W e Y en varios tramos de edad, se aboga por el uso sistemático de la vacuna meningocócica tetravalente A, C, W e Y (MenACWY) a los 12 meses y a los 12-14 años de edad. Tras la autorización del cambio en la posología de la vacuna Nimenrix®, se acepta el uso de una única dosis en primovacunación durante el primer año de vida, siempre que esta se administre a partir de los 6 meses de edad. Si la vacunación se desea llevar a cabo antes de los 6 meses de edad, será dos dosis, a los 2 y 4 meses de edad (la primera dosis se puede administrar desde las 6 semanas de vida).

Si usted quiere más información ó administrar estas vacunas debe contactar con su pediatra/enfermer@ de pediatría, también puede consultar la información del Comité Asesor de Vacunas de la AEP en la siguiente página web: www.vacunasaep.org