



## INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL PARA PADRES (2021)

*Siguiendo las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas (CAV), perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP), realizado por el Grupo de Trabajo de Vacunas de APap Canarias*

### NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP) en su última publicación de enero de 2021 sobre el calendario vacunal recomendado para la población pediátrica española, incluye dos vacunas que actualmente no están financiadas en nuestra Comunidad Autónoma.

**1. Vacunas antirrotavirus:** El rotavirus es el principal productor de diarrea en los primeros años de la vida y afecta, al menos una vez, a todos los niños/as menores de 5 años. Las vacunas disponibles han demostrado su seguridad y efectividad tanto en niños/as a término como en prematuros/as.

No hay datos de seguridad, inmunogenicidad ni eficacia si se intercambian las 2 vacunas, por lo que **se recomienda completar la pauta de administración ya iniciada con la misma vacuna.**

**Rotateq®:** Se administran por vía oral 3 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo 4 semanas. La primera dosis debe administrarse antes de las 12 semanas de vida y la última antes de las 32 semanas.

**Rotarix®:** Se administran por vía oral 2 dosis, a partir de las 6 semanas de vida, separadas como mínimo de 4 semanas. La primera dosis debe administrarse preferiblemente antes de las 12 semanas de vida (en ficha técnica admite hasta la semana 20) y la última dosis debe administrarse antes de las 24 semanas.

**2 Vacuna frente al Meningococo ACWY:** En septiembre de 2017 se ponen a disposición del público general dos vacunas tetravalentes frente a los serotipos A, C, W e Y del meningococo. Como consecuencia del aumento significativo de los casos de meningitis y sepsis producidas por los serogrupos W e Y en los últimos años en nuestro país, el CAV recomienda el uso de la vacuna MenACWY a los 12 meses (en sustitución de MenC) y a los 12 años (ya financiada por el SNS desde 2019 a todos los/as adolescentes nacidos/as a partir de enero 2007) de forma generalizada.

Para aquellas familias que, de forma individual, quieran proteger a sus hijos de los 4 serogrupos antes del año, podrían hacerlo con la única de las vacunas licenciadas para su uso desde las 6 semanas de vida (Nimenrix®).

En estos casos, según el inicio de la vacunación la pauta puede ser:

- < 6 meses: 2 dosis (2 meses- 4 meses) y el refuerzo a los 12 meses y 12 años
- 6 - 12 meses: 1 dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 12 meses y 12 años (habiéndose administrado MenC a los 4 meses).

*Si usted quiere más información o administrar estas vacunas debe contactar con su pediatra/enfermer@ de pediatría. Puede consultar la información del Comité Asesor de Vacunas de la AEP en la siguiente página web: [www.vacunasaep.org](http://www.vacunasaep.org)*

